

L'OTITE MUQUEUSE A TYMPAN OUVERT
Pr Nouikes Zitouni .S
Service ORL, CHU Annaba
Année universitaire : 2019/2020

I. DEFINITION

C'est un état inflammatoire chronique de la muqueuse de l'oreille moyenne associé à une otorrhée s'éliminant spontanément par une perforation tympanique.

II. DIAGNOSTIC

1. Signes d'appel :

1-1 l'otorrhée, habituellement minime, filante, inodore, mais permanente. A l'occasion d'épisodes de réchauffement (baignade ou rhinopharyngite), elle devient purulente, abondante et parfois fétide.

1-2 l'hypoacousie : d'importance variable, souvent négligée par le patient.

2. Données de l'examen clinique :

1-1 l'otoscopie au microscope montre, après nettoyage du conduit une perforation tympanique de taille variable, antéro-supérieure ou réniforme, voire subtotale de la pars tensa, mais non marginale (elle n'atteint pas les parois du conduit et est bordée de tympan). A travers cette perforation, la muqueuse apparaît oedémateuse, rose saumon et luisante.

1-2 l'acoumétrie objective souvent une surdité de transmission.

1-3 l'examen de la sphère ORL revêt une importance capitale. Il doit être particulièrement centré sur les sinus et le rhinopharynx.

3. **Audiométrie** : met en évidence une surdité de transmission de 30 à 50 dB.

III. EVOLUTION

1. Non traitée : elle est marquée par la succession d'épisodes de réchauffement avec aggravation lente de la surdité.

2. Traitée : elle évolue vers la guérison, au prix de séquelles. Ces dernières sont de 2 types : la perforation tympanique, et les lésions ossiculaires.

IV. TRAITEMENT

Repose sur :

1 Des règles hygiéniques :

- Eviction de l'eau
- Désinfection rhinopharyngée
- Ablation des végétations adénoïdes

- Prise en charge d'un facteur d'environnement ou général (tabagisme passif, RGO, allergie)
- Éviter la stagnation des sécrétions dans le conduit auditif externe: aspirations répétées si nécessaire

2 **Les médicaments** : antibiotiques par voie locale et générale, parfois des corticoïdes en cures discontinues.

Traitement des foyers infectieux de voisinage.

3 **Traitement chirurgical** : consiste en la fermeture de la perforation tympanique séquellaire et la réparation d'un éventuel dégât ossiculaire, c'est la tympanoplastie. Cette intervention n'est envisagée que lorsqu'il y a stabilisation des lésions et en dehors des épisodes de réchauffement.