UNIVERSITE BADJI MOKHTAR FACULTE DE MEDECINE- ANNABA
Service de Parasitologie - Mycologie Médicales
Enseignement destiné aux étudiants de 4^{ème} Année Pharmacie
Professeur R. MANSOURI

CONDUITE À TENIR DEVANT
UNE HYPER ÉOSINOPHILIE EN PARASITOLOGIE-
MYCOLOGIE

Pr Mansouri R.

UNIVERSITE BADJI MOKHTAR FACULTE DE MEDECINE- ANNABA
Service de Parasitologie - Mycologie Médicales
Enseignement destiné aux étudiants de 4^{ème} Année Pharmacie
Professeur R. MANSOURI

CONDUITE À TENIR DEVANT

UNE HYPER ÉOSINOPHILIE EN PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE

Prérequis : Les helminthoses s'accompagnant d'une HES

Conduite a tenir devant un LBA en Parasitologie-Mycologie

Généralités

Les PNE : possèdent 1 rôle de lutte contre les agents infectieux de gde taille / les parasites.

Physiologiquement : PNE (<3%) ils ↑ en cas d'infection.

PNE 50-450 élets/mm³

Rôle :

dualité fonctionnelle des Eo

Rôle protecteur au cours des helminthoses

Rôle néfaste ds les pathologies allergiques et idiopathique

Pr Mansouri R.

L' HES

PNE $\geq$ 500élé/mm³ correspondant à 0,5 G/l

- ✓ HE légère < 1500élé/mm³,
- ✓ modérée 1500-5000élé/mm³,
- ✓ massive si > 5000élé/mm³,

Pr Mansouri R.

Classification des HES:

Sur le plan étiologique, les HE sont classées:

HE primaire = néoplasique

HE secondaire :

Allergique

Non Allergique ≡ HE parasitaire

HES parasitaire

**Déf : Due principalement aux helminthes,
++Ceux dt le cycle parasitaire possède
une phase tissulaire.**

**Certaines ectoparasitoses s'accompagnent d'une
HE tel que
la Gale et les Miyases**

**Les protozoaires : HE Sauf exceptionnellement
/toxoplasmose, leishmaniose, *Dientamoeba fragilis*, et
Isospora belli avec une HE fécale et constante.**

CONDUITE À TENIR DEVANT
UNE HYPER ÉOSINOPHILIE EN PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE

La Conduite proprement dite

Pr Mansouri R.

Le recueil de renseignements: fiche de renseignements / Questionnaire

Données admin.

Nom, Prénom, Age adresse...Profession

Données épidémiologique:

- ✓ **Origine géographique** ou **Notion de séjour en zone d'endémie** La recherche de la **notion de voyage** oriente vers une parasitose autochtone ou non autochtone et tous les séjours à l'étranger même anciens doivent être pris en considération
 - ✓ **Notion de baignade ds eau douce Bilharziose Amibes libres**
 - ✓ **Les habitudes culinaires vgtx aquatiques sauvages cressons.....**
- la notion du contact avec des animaux / chiens (kyste hydatique, toxocarose) **Mode de vie (rural , Ax) / Profession berger agriculteur marche pieds nus Ang Ank**
- ❖ **La prise médicamenteuse ou ATCD médicaux:** allergie, atopie familiale, asthme, hémopathies, cancers divers

Données cliniques :

- ❖ Fièvre : trichinellose, bilharziose
- ❖ Diarrhée, douleurs abdominales : vers intestinaux. Ang
- ❖ Masse abdominale :KH . signes pulmonaires
- ❖ manifest cutanées allergiques Troubles cutanés : oedèmes (filariose, trichinellose,), sillon (gâle), nodules (onchocercose).
 , prurit rash cutané, arthralgie, myalgie, poussée d'urticaire...Bilharziose
- ❖ Douleurs hépatiques :distomatose
- ❖ Dysurie et Hématurie douleurs pubiennes: bilh genito-

Orientations paracliniques :

Écho hépatique:

KH avec nbreuses vésicules filles

Rx :

image kystique/ distomatoses

plumoniaires

TDM:

Distomatose à F h.

Endoscopie: *Ascaris* enclavé dans la papille larve d'ang

Orientations biologiques:

1.Hémogramme :

HES : helmintoses en phase d'invasion.

2.VS et CRP:

Augmentées en phase d'invasion

3.Ig E totales :

**Augmentés au cours des helminthoses
tissulaires KH....**

4. Enzymologie hépatique /musculaire

B. La conduite a tenir selon l'évolution de l'HES

Éosinophilie > 500 /mm³

Allergie/Atopie/Médicament

Non

Oui

**Suspicion d'
helminthoses**

**Écarter/trt de la
cause**

3 groupes :

- **Gr I HES importante de courte durée**
- **Gr II HES persistante**
- **Gr III HES élevée oscillante**

I. GROUPE 1: HES importante de courte durée

courbe de lavier

❖ **HES 0** /phase de latence,s

❖ **HES ↑↑↑** / phase d’invasion dite tissulaire (foie, cœur, poumons...)

❖ **HES se normalise** / phase d’état dite digestive où le parasite est éliminé

Parasitoses : **Ascaridiose – Ankylostomose -**

Pr Mansouri R.

Dictomatose

□ La CAT pd la phase d'invasion :

faire un Diagnostic sérologique:

Coupler technique Ag figuré et une technique Ag soluble :

➤ Ag figurés : IFI **à connaître**

➤ Ag solubles: HAI, Elisa, IEP , WB...**à**

connaître

Interprétation selon le contexte épidémiologique et clinique

Rx croisées ; faux + ; Faux -

□ La CAT pd la phase d'état :

Faire une Coproparasitologie

❖ **Examen macroscopie: anneaux , adultes , larves**

❖ **Examen microscopique:**

ED

techniques de concentrations:

❖ **Bailanger**

❖ **Kato katz++**

❖ **Willis ++ à connaitre...**

□ **La MEV:**

✓ Œufs (*Trichocéphale, Ascaris,, Ankylostome, Douves, Taenia solium*)

✓ Larves rhabditoides

✓ Œufs d'Oxyure et *Taenia saginata*

(accidentellement)

Si (-) => REFAIRE L'EX
COPROPARASITOLOGIQUE 3 fois
A QQ J D'INTERVALLE

❖ Scotch test anal = Test de Graham:
Mev d'œufs d'Oxyure et de *Taenia saginata*

❖ Coproculture :

❖ Méthode de brumpt:

- Larves strongyloïdes d'ankylostomes

❖ Tubage duodéal:

Distomatose : mev d'œufs / Liq

II . Groupe II : HES PERSISTANTE

MASSIVE : Le cas de : Filariose – Toxocarose – Trichinellose

MODEREE : Le cas de : Bilharziose – Hydatidose (+/-)

**HES PERSISTANTE / phase
tissulaire+ calcifications (+/-)**

1. La conduite a tenir :

1) Diagnostic direct

❖ Ex parasitologique des urines
mev d'œufs de *S. haematobium*

❖ Biopsie :

Mev des œufs calcifiés de
schistosoma ; larve enkystée de
trichine

❖ Frottis sanguin ,GE *Loa loa*
diurne
Filaire lymphatique nocturne
Mev des μ filaires

Pr Mansouri R

Onchocercose

2) Diagnostic sérologique:

Coupler 2 techniques Ag figuré / Ag soluble :

➤ **Ag figurés : IFI**

➤ **Ag solubles HAI, Elisa, WB, IEP...**

Interprétation selon le contexte épidémiologique et clinique

Rx croisées ; faux + ; Faux -

III. Groupe 3 : HES ELEVÉE ET OSCILLANTE

HES ↑↑ et oscillante/

**Il s'agit d'un cycle d'auto-
infestation permanent**

Le cas de : Anguillulose

❑ La conduite a tenir :

❑ examen direct

MEV des Rhabditoïdes

❑ Coproculture

❑ Technique spécifique ; de

Baermann et Lee:

Extraction des larves rhabditoïdes

Hygrotropisme et
Thermotropisme
Selles fraîches
T°: 45°C
3 heures

Autres:

❖ Gale:

Grattage des lésions ==>»Mev de sarcoptes

❖ Les myiases:

Extériorisation à la peau d'une larve de mouche

❖ Les mycose

ABPA *Aspergillus fumigatus*

(ED + coloration + sérologie (IEP +++))

Prise en charge thérapeutique

TRT PROBABILISTE

- ❖ **Praziquantel (BITRICIDE®): 15 mg/kg prise unique**
- ❖ **Flubendazole (FLUVERMAL®): relais**
- ❖ **Ivermectine (STROMECTOL®): relais du Praziquantel si suspicion d'anguillulose et exclusion de filariose (car risque de lyse des filaires)**
- ❖ **Albendazole (ZENTEL®): TRT des Filaires 10 mg/Kg/j pd 5jrs**

TRT PROBABILISTE

NFS de contrôle
2 sem après la 2^{ème} cure de Flubendazole
Ou
2 mois après la cure d'Ivermectine ou
d'Albendazole

Disparition de l'HE

TRT APRES DIAGNOSTIC

Nématodoses

Albendazole

Flubendazole

Trématodoses :

Praziquantel

Cestodoses

Praziquantel

Niclosamide

Cestodoses larvaires :

Chirurgie

Filarioses:

Diethyl carbamazine

Gale, Myase :

Ivermectine

Pr Mansouri R.
rmansouri2018@gmail.com

Pr Mansouri R.