UNIVERSITE BADJI MOKHTAR FACULTE DE MEDECINE- ANNABA
Service de Parasitologie - Mycologie Médicales
Enseignement destiné aux étudiants de 4^{ème} Année Pharmacie
Professeur R. MANSOURI

Conduite à tenir devant un LBA en Parasitologie-Mycologie

Pr Mansouri R.

UNIVERSITE BADJI MOKHTAR FACULTE DE MEDECINE- ANNABA
Service de Parasitologie - Mycologie Médicales
Enseignement destiné aux étudiants de 4^{ème} Année Pharmacie
Professeur R. MANSOURI

Conduite à tenir devant un LBA en Parasitologie- Mycologie

Prérequis : les parasitoses et les mycoses
pulmonaires *déjà enseignés en conférences & photocopiés*

Introduction

- Les parasitoses et les mycoses retrouvées dans le liquide du LBA sont diverses et variées et leur diagnostic doit être précoce .
- Le LBA est un prélèvement peu invasif qui permet un diagnostic de certitude chez les patients immunodéprimés surtout chez les sidéens
- Il est pratiqué lors de troubles pulmonaires aigus ou insidieux (toux, dyspnée)
- Fièvre +/-
- Image radiologique évocatrice

Introduction

- LBA le poumon pouvant être la cible pour nombreux agents parasitaires et/ou fongiques:
 - A tropisme pulmonaire
 - Ayant une porte d'entrée pulmonaire « inhalation »
 - Se trouvant au niveau pulmonaire suite à une phase de leur cycle
 - Opportunistes

Définition

- ✓ Le lavage broncho-alveolaire (LBA) est fait au cours d'une fibroscopie bronchique. Il est réalisé avant toute biopsie bronchique
- ✓ Le LBA est un outil diagnostique peu invasif, permet de caractériser la santé des alvéoles.
- ✓ Permet d'identifier le pathogène responsable en cas d'infection pulmonaire surtout chez le sujet immunodéprimé

Indications du LBA Parasitologie

Les agents pathogènes à tropisme pulmonaire

- ❖ *Echinococcus granulosus* : Kyste Hydatique pulmonaire
- ❖ *Paragonimus westermani* : Distomatose pulmonaire, Paragonimose
- ❖ *Entamoeba histolytica*: Amoebose pulmonaire

Indications du LBA Parasitologie

Les parasites qui passent par le poumon: Syndrome de Loëffler

- ❖ Larves de :
 - ✓ *Ascaris lumbricoides*
 - ✓ *Ankylostome*
 - ✓ *Strongyloïdes stercoralis*
au stade 3
- ❖ Schistosomules de *Schistosoma japonicum*
- ❖ Microfilaires de *Wuchereria bancrofti* et *Brugia malayi*

Indications du LBA Parasitologie

Les parasites opportunistes

❖ *Toxoplasma gondii*

❖ *Leishmania spp*

❖ *Cryptosporidium parvum*

❖ *Strongyloides stercoralis* (I.D liée à la corticothérapie prolongée)

Indications du LBA Mycologie

- ❖ *Pneumocystis jirovecci*
- ❖ *Aspergillus sp*
- ❖ *Cryptococcus neoformans*
- ❖ *Candida sp*
- ❖ *Microsporidies*
- ❖ *Autres: les champignons dimorphiques: Penicillium marneffeii
Histoplasma capsulatum...*

Réalisation du lavage broncho-alvéolaire

- ❖ Réalisé pendant une bronchoscopie souple.
- ❖ Personne assise et introduction préférentielle par le nez.
- ❖ Solution isotonique (sérum physiologique) stérile chauffé à 37°C.
- ❖ 4 à 6 instillations de 20 à 60 ml.
- ❖ Aspiration douce suffisante.
- ❖ Le % du liquide récupéré / volume injecté varie entre 60 – 80 %.
- ❖ Acheminement immédiat au laboratoire .
- ❖ En cas de délai d'acheminement , conservation à +4°C

Pr Mansouri R.

Fiche de renseignements

- ❖ Identité du patient (nom, prénom, âge).
- ❖ Signes cliniques ayant motivé la demande.
- ❖ Notion de séjour en zone d'endémie ou l'origine géographique
 - ✓ États-unis / Chp dimorphiques
 - ✓ Asie du sud Est / Penicilliose
- ❖ Exploration biologique :
 - HES/ Anguillulose, Ascaridiose, Hydatidose...
 - Radiologique : Images excavées / *Aspergillus*
Pneumopathies interstitielles bilatérales / *Pneumocystis*
Images en boulets de canon / *Echinococcus granulosus*
- ❖ **Statut immunitaire:**
 - Immunocompétent / **Immunodéprimé**

Traitement du prélèvement

Examen macroscopique

- ❖ Aspect normal: Couleur clair
- ❖ Aspect pathologique:
 - ✓ Rosé ou rouge: hémorragie alvéolaire
 - ✓ Laiteux: Lipoprotéinose alvéolaire

Traitement du prélèvement

Liquide du LBA

- Examen direct à l'état frais
- Centrifugation 1500-2000 tours/min pendant 10 min
 - ✓ Surnageant
 - ✓ Culot
- Une partie: conservée à + 4 °c

Examen après centrifugation

Surnageant

- Recherche d'Ag soluble
Agglutination / ELISA
- Culture cellulaire pour *T. gondii*

Culot

- État frais.
- Examen direct à l'encre de chine.
- Frottis colorés
- Culture
- Immunofluorescence.
- Biologie moléculaire

Examen après centrifugation

Surnageant

Recherche d'antigènes circulants pour le *Cryptococcus neoformans*:
par test d'agglutination (pastorex): anticorps monoclonal anti-glucuronoxylomannane

Culture cellulaire sur MRC5 ou TPH1 pour *Toxoplasma gondii*: lecture 4-5 jours.
(Actuellement peu réalisée)

Examen après centrifugation

Culot

État frais

➤ Résultats:

- ✓ Tête aspergillaire : *Aspergillus sp*
- ✓ Levures: *Candida sp*
- ✓ Larves : d'Anguillule
- ✓ Sable hydatique : *Echinococcus granulosus*

Examen après centrifugation

Culot

Examen direct à l'encre de chine.

Principe:

MEV de **la capsule** de *Cryptococcus neoformans* : mélange d'une goutte d'encre de chine diluée au 1/3 ou au 1/5 avec une goutte du culot

➤ Résultats:

Les levures sont entourées d'un halo clair représentant la capsule .

Examen après centrifugation

Culot

➤ Frottis colorés

Les colorations:

- ✓ Coloration au MGG.
- ✓ Coloration au Bleu de toluidine .
- ✓ technique de Gomori-Grocott modifiée.
- ✓ Technique du Ziehl- Neelsen modifiée.
- ✓ Technique de trichrome de Gomori modifiée .

Technique de coloration	Résultat
MGG	<p data-bbox="613 730 1209 779"><i>Leishmania sp</i> (formes amastigotes) </p> <p data-bbox="613 877 860 926"><i>Toxoplasma sp</i> </p> <p data-bbox="613 1024 982 1073"><i>Pneumocystis jirovecii</i> </p> <p data-bbox="613 1171 846 1220"><i>Aspergillus sp</i> </p>
Bleu de toluidine	<p data-bbox="613 1333 982 1381"><i>Pneumocystis jirovecii</i> </p>

Technique de coloration	Résultat
Gomori-Grocott modifiée par Musto	<p><i>P.jirovecii</i> par imprégnation argentique.</p>
Ziehl-Neelsen modifiée	<p>MEV des oocystes de <i>Cryptosporidium sp</i></p>
Trichrome de Gomori	<p>MEV des spores des microsporidies.</p>

Examen après centrifugation

Culot

- Culture

En parasitologie

Sur milieu NNN

Incubation 24-26°C

Pour: *Leishmania sp* (forme promastigote)

En mycologie

Sur milieux SC et SCA

Incubation à 37°C

Pour: *Candida sp*, *Cryptococcus neoformans*, *Aspergillus sp*

Examen après centrifugation

Culot

- Immunofluorescence directe

Principe:

MEV des Ag spécifiques par des Ac monoclonaux.

Parasite /Champignon	Anticorps monoclonal utilisé
<i>Pneumocystis</i>	anti- kystes <i>P.jirovecii</i>
<i>Toxoplasma gondii</i>	anti-P30 membranaire
<i>Cryptosporidium</i>	Anti-oocystes de <i>Cryptosporidium</i> (IFD)

Examen après centrifugation

Culot

- Biologie moléculaire

Principe de la PCR:

Méthode basée sur la détection et l'amplification d'une séquence d'ADN.

Indication:

- ❖ *Toxoplasma gondii* +++
- ❖ autres: *Pneumocystis jirovecii* ,...*Candida sp.*.
- ❖ AV : sensibilité+++ ; rapidité.

Conduite Diagnostique

Hyperéosinophilie

❖ Syndrome de Loëffler (SL)

Etat frais du culot de centrifugation

- ❖ Larve stade 3 d'*Ascaris lumbricoides*,
Ankylostome,
Strongyloïdes stercoralis

Kyste hydatique pulmonaire Protoscolex
d'*Echinococcus granulosus*

- ❖ *Distomatose pulmonaire* Œufs de *Paragonimus westermani*

- ❖ *Bilharziose pulmonaire* Schistosomules de
Schistosoma japonicum

Conduite Diagnostique

Hyperéosinophilie

❖ Syndrome de Loëffler (SL)

Frottis coloré du culot de centrifugation

❖ **Poumon éosinophile tropical** Microfilaires de *Wuchereria bancrofti* et *Brugia malayi*

Conduite Diagnostique

Un état d'immunodépression

Parasitoses opportunistes

Toxoplasmose--- *Toxoplasma gondii*

Frottis coloré au MGG_ **Trophozoïtes**

IFD PCR Culture cellulaire

Leishmaniose---*Leishmania* sp

Frottis coloré au MGG → Formes amastigotes

Culture sur NNN → Formes promastigotes

Cryptosporidiose à *Cryptosporidium parvum*

Coloration de ZIEHL NEELSEN modifiée → oocystes

Pr Mansouri R.

IFD: Monofluokit Cryptosporidium

Conduite Diagnostique

Un état d'immunodépression

Mycoses opportunistes

Pneumocystose --- *Pneumocystis jirovecii*
MGG → cytoplasme des trophozoites et les corps intrakystiques colorés en **bleu** avec un **noyau rouge**

Musto: imprégnation argentique → Mev la paroi des kystes colorée en **brun noir sur un fond vert**

Ortho toluidine → mev la paroi des kystes colorée en **bleu violacé** aspect en « ballons dégonflés »

Conduite Diagnostique

Un état d'immunodépression

Mycoses opportunistes

Microsporidiose ---Microsporidies
coloration de TRICHROME DE WEBER → Mev de spores ovoïdes de 1 à 1.5 μ de $\emptyset$ colorées en **rose clair** avec une vacuole nette sur **fond vert pale**
UVITEX: Composé fluorescent qui met en évidence les spores de Microsporidies

Aspergillose ---Aspergillus sp

- État frais + frottis coloré au MGG → mev de **Filaments septés de 2 à 5 μ m** de diamètre dichotomie /45°
- Culture sur (S+C) → incub 03- 05 jours à 25°C/37°C → Identification (macroscopie, microscopie) = Antigénémie: recherche de l'Ag galactomannane

Conduite Diagnostique

Un état d'immunodépression

Mycoses opportunistes

Cryptococcose---Cryptococcus neoformans

- État frais à l'encre de Chine → mev de levures encapsulées entourées d'un halo clair

- Culture sur (S+C) → incub à 25°C/37°C pd 3 jrs → Colonies blanc crèmes avec aspect coulant et muqueux

- Recherche d'Ag cryptococcique → Pc de latex sensibilisées avec l'Ac Mn antiglucuronoxylomanane

Conduite Diagnostique

Un état d'immunodépression

Mycoses opportunistes

Candidose---Candida albicans

État frais → mev de levures, filaments, et/ou pseudofilaments

Culture sur (S+C) → incub à 37°C pd 24 à 48h → **Colonies blanchâtres crémeuses et lisses** →
identification

Antigénémie : recherche de l'Ag mannane candidosique

Pr Mansouri R.

Conduite Diagnostique

Un état d'immunodépression

Mycoses opportunistes

Penicilliose ----*Penicillium marneffei*:

EXD: cellules de petites tailles 2 à 3 µm / 2 à 6,5 µm.

Culture: 37°C milieu de Sabouraud sans Actidione : pigment rouge vif, diffusible.
microscopie= mev du conidiophore → aspect en pinceau

Recherche de l'Ag

Dimorphiques

Frottis coloré au MGG, **PAS**, coloration argentique (**Grocott-Gomori**)

Culture dangereuse

CONCLUSION

La réalisation d'un **LBA** précocement à la recherche d'une Parasitose ou Mycose pulmonaire améliore la prise en charge du patient atteint essentiellement le sujet immunodéprimé