Séance de travaux dirigés:

Cas clinique: Diabète

D^r CHEMMI.H

Service de Médecine interne – CHU d'Annaba

houria.ch23@gmail.com

- Mr B.Riad âgé de 52 ans , plombier
- Tabagique 35 paquets /année
- HTA sous candesartan cp 16mg/j+
Amlodipine cp 10mg
- ATCD d'occlusion intestinale
- Aux ATCD familiaux :
- DT2 et HTA chez sa mère
- IDM chez son père
- Kc médullaire de la thyroïde chez sa sœur

Consultation

Bilan
annuel

▪ A l'examen clinique :

- ✓ Poids = 99 kg , taille= 1,80 m, TT=114cm
- ✓ Examen cardio-pulmonaire : normal
- ✓ Les pouls: présents et symétriques
- ✓ PA=135/75mm Hg
- ✓ FO: rétinopathie hypertensive stade 1

▪ Bilan biologique:

- ✓ GAJ=1,70 g/l → GAJ= 1,85g/l
- ✓ CDU=Glu(+),Act(-),Prot(-),
Nitrites (-), leucocytes (-)
- ✓ Hb A1C=08,50%
- ✓ TG=1,70g/l, HDL=0,35g/l,
LDL=1,76g/l,CholT=2,80g/l.
- ✓ Créatininémie=10mg/l,
Urée=0,35g/l

Question 1

- **Interprétez les données cliniques et biologiques.**
- **Quelles sont vos conclusions diagnostiques?**

Réponse 1

- **Interprétez les données cliniques et biologiques.**

- Un homme de la cinquantaine , tabagique, hypertendu, obèse

(IMC= 30,55)

- Il présente **Diabète sucré type 2:**

*Diabète sucré : 2 glycémies à jeun > 1.26g/l

*Type 2 : âge>40 ans, obésité (IMC=30,55 , TT >102 cm), ATCD

familiaux de DT2

- Dyslipidémie

Critères pour le diagnostic du diabète

1	Glucose mesuré à jeun* ≥ 126 mg/dL (7,0 mmol/L). * à jeun pendant au moins 8 h.
ou	
2	Symptômes d'hyperglycémie: glucose mesuré après le dernier repas ≥ 200 mg/dL (11,1 mmol/L). Présence de polyurie, polydipsie et perte de poids inexplicée.
ou	
3	Test hyperglycémie 2 heures après ingestion de 75 gr de glucose (dissous dans l'eau) ≥ 200 mg/dL (11,1 mmol/L).
ou	
4	HbA1c $\geq 6,5$ %.

IMC = Indice de Masse Corporelle

$$\text{IMC} = \frac{\text{poids en kilos}}{(\text{Taille X Taille}) \text{ en mètres}}$$

Réponse 1

■ Quelles sont vos conclusions diagnostiques?

Le patient présente:

Un diabète type 2

+

FRCV :

- HTA
- Tabac
- Dyslipidémie
- Obésité

Très haut RCV

Question 2

❖ **Décrivez brièvement votre stratégie thérapeutique**

Réponse 2

❖ Mesures hygiéno-diététiques:

- Arrêt du tabac
- Régime alimentaire
- Activité physique

❖ Traitement hypo-lipémiant et antihypertenseur

❖ Traitement antidiabétique

Question 2

❖ Pour le traitement antidiabétique choisi, précisez:

- Le mode d'action
- Les principaux effets indésirables & risques
- Les contre-indications

MEDICAMENTS REDUISANT LE GLUCOSE DANS LE DIABETE DE TYPE 2 / APPROCHE GLOBALE

METFORMINE EN PREMIÈRE INTENTION ET UNE HYGIENE DE VIE (Y COMPRIS LA GESTION DU POIDS ET L'ACTIVITÉ PHYSIQUE) SI HbA1c AU-DESSUS DE LA CIBLE

Pour éviter l'inertie clinique, réévaluez et modifiez régulièrement le traitement (3 à 6 mois)

MCVA ou MRC ETABLIS

NO

Sans MCVA ou MRC

PREDOMINANCE MCVA

Soit Ou

GLP-1 avec avantage prouvé sur MCV¹

SGLT2 avec bénéfice MCV¹, prouvé si le DFG est adéquat²

Si HbA1c sup à la cible

si une intensification supplémentaire est nécessaire ou patient n'a pas toléré le GLP 1 RA et / ou SGLT2, choisir agents ayant démontré une sécurité CV

- envisager d'ajouter d'autres classe (GLP-1 ou SGLT2) ayant prouvé un bénéfice CV
- DPP4i s'il n'est pas sur GLP-1
- Insuline basale⁴
- TZD5
- SU6

PREDOMINANCE IC ou MRC

De préférence

SGLT2i avec des preuves de réduction de l'IC et/ou progression de la MRC si le DFG est adéquat³

OU

Si SGLT2i n'est pas toléré ou contre-indiqué ou si le DFG est moins adéquat, ajoutez du GLP-1 avec un bénéfice¹ prouvé sur MCV.

Si HbA1c sup à la cible

Évitez TZ dans le cadre de l'IC Choisir un agent démontrant la sécurité CV Envisager d'ajouter d'autres classes ayant prouvé un bénéfice¹ CV

- DPP4i (non saxagliptine) dans le cadre de l'IC (s'il n'est pas sous GLP1)
- Insuline basale⁴
- SU⁶

Besoin impérieux de minimiser l'hypoglycémie

DPP4i

GLP-1

SGLT2i²

TZD

Si HbA1c sup la cible

SGLT2² OU TZD

SGLT2² OU TZD

GLP-1 RA OU DPP-4i OU TZD

SGLT2² OU DPP-4i OU GLP-1 RA

Si HbA1c sup à la cible

Continuez avec l'ajout d'autres agents comme indiqué ci-dessus

Si HbA1c sup à la cible

Considérer l'ajout de SU² Ou l'insuline basale:
- Choisissez les derniers SU avec moins de risque d'hypoglycémie
- Envisager l'insuline basale qui a le moindre risque d'hypoglycémie⁷

Besoin impérieux de minimiser le gain de poids ou de promouvoir la perte de poids⁸

GLP-1 avec bonne efficacité sur la perte de poids

Soit Ou SGLT2i²

Si HbA1c sup à la cible

SGLT2i²

GLP-1 avec bonne efficacité sur la perte de poids

Si HbA1c sup à la cible

Si une trithérapie est requise ou si le SGLT2i et / ou le GLP-1 ne sont pas tolérés ou contre-indiqués, utilisez le schéma posant le risque le plus faible de prise du poids.

De préférence DPP4i (s'il n'est pas sur GLP-1) basée sur la neutralité sur le poids

Si le DPP-4i n'est pas toléré ou contre-indiqué ou patient déjà sous GLP-1

Faire attention à l'ajout de:
- SU⁶ - TZD⁵ - insuline Basale

Le coût est un souci majeur⁹⁻¹⁰

SU⁶

TZD¹⁰

Si HbA1c sup à la cible

TZD¹⁰

SU⁶

Si HbA1c sup à la cible

Insulinothérapie: insuline basale la moins chère
Ou
Considérez DPP-4i Ou SGLT2i les moins chers¹⁰

1. Proven CVD benefit means it has label indication of reducing CVD events. For GLP-1 RA strongest evidence for liraglutide > semaglutide > exenatide extended release. For SGLT2i evidence modestly stronger for empagliflozin > canagliflozin.
2. Be aware that SGLT2i vary by region and individual agent with regard to indicated level of eGFR for initiation and continued use
3. Both empagliflozin and canagliflozin have shown reduction in HF and reduction in CKD progression in CVOTs
4. Degludec or U100 glargine have demonstrated CVD safety

5. Low dose may be better tolerated though less well studied for CVD effects
6. Choose later generation SU with lower risk of hypoglycaemia
7. Degludec / glargine U300 < glargine U100 / detemir < NPH insulin
8. Semaglutide > liraglutide > dulaglutide > exenatide > lixisenatide
9. If no specific comorbidities (i.e. no established CVD, low risk of hypoglycaemia and lower priority to avoid weight gain or no weight-related comorbidities)
10. Consider country- and region-specific cost of drugs. In some countries TZDs relatively more expensive and DPP-4i relatively cheaper

Réponse 2

❖ Traitement médicamenteux : Biguanides:

- Avantages de **la Metformine**:

- ✓ Pas d'hypoglycémie

- ✓ Pas de prise de poids

- ✓ **Efficacité de la Metformine : HbA1c : - 1.2 % (valeur absolue)**

- **Effets secondaires principaux:** troubles digestifs (diarrhées)

- **Risque :** acidose lactique (1 / 40 000 années-patients)

Réponse 2

❖ Biguanides: mécanisme d'action:

Réduisent la production hépatique de glucose en inhibant la néoglucogénèse et la glycogénolyse hépatique.

augmentent la sensibilité à l'insuline, en favorisant la captation et l'utilisation périphérique du glucose.

Retardent l'absorption intestinale du glucose.

Réponse 2

❖ Biguanides:

• Contre-indications :

- Insuffisance cardiaque
- Insuffisance hépatique
- Insuffisance rénale sévère
- Insuffisance respiratoire sévère
- Agression aigue : SCA récent, infection sévère, déshydratation
- Grossesse et allaitement.

Question 3

❖ **Quel sera votre paramètre de surveillance?**

Réponse 3

❖ Quel sera votre paramètre de surveillance?

Objectifs d'HbA1c révisés (ADA/EASD 2012)

Question 3

- ❖ Six mois plus tard, vous revoyez votre patient, il est sous MHD et metformine cp 1000 mg 03x/j. L'HbA1c est à 08,90 %.
- Quelle thérapeutique hypoglycémiante lui proposez-vous ?
- Justifier.

Réponse 3

Six mois plus tard, vous revoyez votre patient, il est sous MHD et metformine cp 1000 mg 03x/j. L'HbA1c = 08,90 %.

Quelle thérapeutique hypoglycémiante lui proposez-vous ?

Justifier.

- Indication de renforcer le traitement hypoglycémiant
- Car HbA1c > 07%

Réponse 3

❖ Optimisation du traitement médicamenteux :

▪ Insulino-sécrétagogues :

✓ Sulfamides hypoglycémiants

✓ Glinides

▪ Inhibiteurs des α glucosidases

▪ **Incrétines** : analogues GLP1, inhibiteurs DPP4.

▪ Inhibiteurs du SGLT2

▪ insulinothérapie

❖ Ressensibiliser le patient aux mesures hygiéno-diététiques.

MEDICAMENTS REDUISANT LE GLUCOSE DANS LE DIABETE DE TYPE 2 / APPROCHE GLOBALE

METFORMINE EN PREMIÈRE INTENTION ET UNE HYGIENE DE VIE (Y COMPRIS LA GESTION DU POIDS ET L'ACTIVITÉ PHYSIQUE) SI HbA1c AU-DESSUS DE LA CIBLE

Pour éviter l'inertie clinique, réévaluez et modifiez régulièrement le traitement (3 à 6 mois)

MCVA ou MRC ETABLIS

NO

Sans MCVA ou MRC

PREDOMINANCE MCVA

PREDOMINANCE IC ou MRC

Besoin impérieux de minimiser l'hypoglycémie

Besoin impérieux de minimiser le gain de poids ou de promouvoir la perte de poids⁸

Le coût est un souci majeur⁹⁻¹⁰

Soit Ou

GLP-1 avec avantage prouvé sur MCV¹

SGLT2 avec bénéfice MCV¹, prouvé si le DFG est adéquat²

Si HbA1c sup à la cible

si une intensification supplémentaire est nécessaire ou patient n'a pas toléré le GLP 1 RA et / ou SGLT2, choisir agents ayant démontré une sécurité CV

- envisager d'ajouter d'autres classe (GLP-1 ou SGLT2) ayant prouvé un bénéfice CV
- DPP4i s'il n'est pas sur GLP-1
- Insuline basale⁴
- TZD5
- SU6

De préférence
SGLT2i avec des preuves de réduction de l'IC et/ou progression de la MRC si le DFG est adéquat³

OU

Si SGLT2i n'est pas toléré ou contre-indiqué ou si le DFG est moins adéquat, ajoutez du GLP-1 avec un bénéfice¹ prouvé sur MCV.

Si HbA1c sup à la cible

Évitez TZ dans le cadre de l'IC
Choisir un agent démontrant la sécurité CV
Envisager d'ajouter d'autres classes ayant prouvé un bénéfice¹ CV

- DPP4i (non saxagliptine) dans le cadre de l'IC (s'il n'est pas sous GLP1)
- Insuline basale⁴
- SU⁶

Continuez avec l'ajout d'autres agents comme indiqué ci-dessus

Si HbA1c sup à la cible

Considérer l'ajout de SU² Ou l'insuline basale:

- Choisissez les derniers SU avec moins de risque d'hypoglycémie
- Envisager l'insuline basale qui a le moindre risque d'hypoglycémie⁷

GLP-1 avec bonne efficacité sur la perte de poids

Soit Ou

SGLT2i²

Si HbA1c sup à la cible

Si HbA1c sup à la cible

Si une trithérapie est requise ou si le SGLT2i et / ou le GLP-1 ne sont pas tolérés ou contre-indiqués, utilisez le schéma posant le risque le plus faible de prise de poids.

De préférence
DPP4i (s'il n'est pas sur GLP-1) basée sur la neutralité sur le poids

Si le DPP-4i n'est pas toléré ou contre-indiqué ou patient déjà sous GLP-1

Faire attention à l'ajout de:
- SU⁶ - TZD⁵ - insuline Basale

Si HbA1c sup à la cible

Si HbA1c sup à la cible

Insulinothérapie: insuline basale la moins chère
Ou
Considérez DPP-4i **Ou** SGLT2i les moins chers¹⁰

1. Proven CVD benefit means it has label indication of reducing CVD events. For GLP-1 RA strongest evidence for liraglutide > semaglutide > exenatide extended release. For SGLT2i evidence modestly stronger for empagliflozin > canagliflozin.
2. Be aware that SGLT2i vary by region and individual agent with regard to indicated level of eGFR for initiation and continued use
3. Both empagliflozin and canagliflozin have shown reduction in HF and reduction in CKD progression in CVOTs
4. Degludec or U100 glargine have demonstrated CVD safety

5. Low dose may be better tolerated though less well studied for CVD effects
6. Choose later generation SU with lower risk of hypoglycaemia
7. Degludec / glargine U300 < glargine U100 / detemir < NPH insulin
8. Semaglutide > liraglutide > dulaglutide > exenatide > lixisenatide
9. If no specific comorbidities (i.e. no established CVD, low risk of hypoglycaemia and lower priority to avoid weight gain or no weight-related comorbidities)
10. Consider country- and region-specific cost of drugs. In some countries TZDs relatively more expensive and DPP-4i relatively cheaper

Réponse 3

❖ Optimisation du traitement médicamenteux :

▪ Insulino-sécrétagogues :

✓ Sulfamides hypoglycémiants

✓ Glinides

▪ Inhibiteurs des α glucosidases

▪ **Incrétines** : analogues GLP1, inhibiteurs DPP4.

▪ Inhibiteurs du SGLT2

▪ insulinothérapie

❖ **Ressensibiliser le patient aux mesures hygiéno-diététiques.**

- Metformine cp 1000 mg

01 cp 03x/j

- Gliclazide LM cp 30mg

02cp en une prise le matin

- Le patient était bien équilibré sous metformine 1000mg 3x/j + gliclazide LM cp 30mg 4cp en une prise au petit déjeuner
- Ensuite, il est perdu de vue pendant plusieurs années.
- Il revient vous voir car depuis plusieurs semaines ses glycémies capillaires sont au dessus de 03 g/l
- Il ne comprend pas ce qu'il lui arrive , il a pourtant perdu 05 kg en l'espace de quelques semaines sans effort diététique particulier.
- Son HbA1c est à 11,50 %.

Question 4

Que répondez-vous à votre patient?

Réponse 4

Que lui répondez-vous ?

L'amaigrissement dans ce contexte de diabète déséquilibré (HbA1c=11,5 %) est un signe d'**insulinopénie et non un** signe de bon respect des mesures hygiéno-diététiques

Réponse 4

Diabète de type 2 - Histoire naturelle

- Insulinorésistance-insulinopénie et contrôle glycémique

Question 5

Quels sont les autres signes cliniques à rechercher à l'interrogatoire ?

Réponse 5

Quels sont les autres signes cliniques à rechercher à l'interrogatoire ?

- **Autres signes** : Asthénie, Syndrome polyuro-polydipsique.
- Signes en rapport avec un facteur aigu de déséquilibre :
Urinaire, pulmonaire, ...

Question 6

Quelle est votre attitude thérapeutique ?

Réponse 6

Quelle est votre attitude thérapeutique ?

➤ Insulinothérapie basal en bedtime:

Insuline lente ou ultralente qui reproduit la sécrétion basale d'insuline, inhibe la néoglucogénèse. Contrôle le glucose à jeun et entre les repas.

➤ Arrêt du sulfamide hypoglycémiant

➤ Renforcer les mesures hygiéno-diététiques

INTENSIFICATION DES THÉRAPIES INJECTABLES

Merci