LES HALOGENES

INTRODUCTION

ETAT NATUREL ET PREPARATION PROPRIETES CHIMIQUES

- Propriétés oxydante
- Propriétés réductrices
- Les solutions aqueuses d'halogènes
- Réactions avec les bases- dismutation des halogènes

LES HDRACIDES

- Préparation:
 - a: réaction de déplacement.
 - b: obtention à partir des éléments.
- Propriétés chimiques: - propriétés acido-basique
 - propriétés oxydo-réductrices

LES HALOGENURES:

- ioniques.
- covalents

Propriétés des halogénures ioniques

- Propriétés acido-basiques
- Propriétés oxydo-réductrices
- Agents de précipitation
- Agents complexants

CARACTERISATION DES HALOGENURES

USAGES

<i>Élément chimique</i>	<i>Configuration électronique</i>	<i>Abondance terrestre</i>	<i>Minéraux principaux</i>	<i>Découverte</i>
F	2s ² 2p ⁵ (7 électrons valentiels)	2.7 · 10 ⁻² %	CaF ₂ (fluorine) Na ₃ AlF ₆ (cryolite) Ca ₅ (PO ₄) ₃ F (apatite)	H. Moissan, 1886
Cl	3s ² 3p ⁵ (3d ⁰) (7 électrons valentiels)	1.9 · 10 ⁻¹ %	NaCl (sel gemme) KCl (sylvinite) KMgCl ₃ · 6 H ₂ O (carnallite)	C. W. Scheele, 1774
Br	4s ² 4p ⁵ (4d ⁰) (7 électrons valentiels)	6.0 · 10 ⁻⁴ %	AgBr	A. J. Balard, 1826
I	5s ² 5p ⁵ (5d ⁰) (7 électrons valentiels)	6.0 · 10 ⁻⁶ %	Ca(IO ₃) ₂	B. Courtois, 1812
At	6s ² 6p ⁵ (6d ⁰) (7 électrons valentiels)	-	trace dans la lithosphère	artificiel 1940 naturel 1944

Propriétés oxydantes:

Le fluor est l'oxydant le plus fort (il oxyde la + part des métaux et non-métaux); peu utilisé (**très grande réactivité**)

(**H₂, H₂S, H₂SO₃, Sn²⁺**) sont oxydés par tous les halogènes

- l'ion **Fe²⁺**, réducteur plus faible que l'ion **I⁻**, peut être oxydé par le chlore ou le brome mais non par l'iode:

Mais $2\text{Fe}^{2+} + \text{I}_2$, ne réagit pas

- l'ion thiosulfate **S₂O₃²⁻**, est oxydé par l'iode sélectivement en tétra thionate **S₄O₆²⁻**:

Les autres halogènes réalisent l'oxydation en sulfates:

-Propriétés réductrices:

Cl_2 , Br_2 et I_2 $\longrightarrow$ réductrice se manifestant surtout dans les réactions de **dismutation** (*réaction dans laquelle le même élément se comporte à la fois comme oxydant et réducteur*)

- Les solutions aqueuses d'halogènes:

- Cl_2 , Br_2 et I_2 sont faiblement solubles dans l'eau, une partie des éléments subit une dismutation:

Dismutation, négligeable dans le cas de l'iode (moins soluble), très faible pour le brome
33% en molécules de chlore se dismutent dans l'eau.

- Réactions avec les bases- dismutation des halogènes:

LES HYDRACIDES

- *Préparation:*

- *Réaction de déplacement:*

La réaction (1) est favorisée par: la force de l'acide réactionnel, H_2SO_4 , supérieure à celle de l'acide produit HF

-La volatilité de HF qui facilite donc son élimination du mélange réactionnel.

-La précipitation du sel produit, CaSO_4

-Remarque: les solutions d'acide fluorhydrique attaquent le verre, ils doivent être conservés dans des récipients en polyéthylène.

La réaction (2, 3), la volatilité de HCl est le facteur favorable qui permet la réalisation de ces réactions.

L'acide bromhydrique, HBr , et l'acide iodhydrique (4, 5), HI , se préparent par réaction de H_3PO_4 sur les sels à chaud

Le choix de H_3PO_4 : - peu volatil- non oxydant.

- étant plus faible que HBr et HI ; la réaction est défavorisée, elle n'est rendue possible que par l'élimination sous forme gazeuse de l'hydracide formé

-Obtention à partir des éléments:

Les mélanges Cl_2 / H_2 , ne réagissent que très lentement à l'obscurité

A la lumière : $Cl_2 / H_2 \longrightarrow$ Réaction explosive

La lumière, facteur d'activation

Rôle: dissociation des molécules de chlore en atomes

Propagation

LES HYDRACIDES : HX

Propriétés physiques	HF	HCl	HBr	HI
Téb (°C)	19,4	- 85	- 67	- 35
EL (Kcal/mole)	135	103	87	71
ΔH (Kcal/mole)	- 64, 2	- 32	- 8,7	+ 6,2

→ composés covalents, gazeux à T(°C) ambiante

→ la stabilité des molécules décroît de HF à HI

→ La Téb de HF > HCl de plus de 100°C → ↓ volatilité de HCl à HF, formation d'aggrégats de HF, suite à la formation de liaisons hydrogènes HF....HF....HF

Les solutions aqueuses d'hydracides

Propriétés acido-basiques:

La force des hydracides augmente dans l'ordre: HF < HCl < HBr < HI

En solution aqueuses, les acides HCl, HBr et HI sont des acides forts:

HF, est un acide faible: il ne se dissocie que partiellement

Propriétés oxydoréductrices:

Purs ou en solution, les hydracides sont des **oxydants**

Réagissent avec les métaux de pouvoir réducteur suffisant en libérant de l'hydrogène:

LES HALOGENURES

Les halogénures peuvent être:

→ ioniques: union des halogènes avec des métaux très électropositifs → solides de Tf ↗
Conduisent le courant électrique.

→ covalents ou moléculaires: union des halogènes avec des non métaux (SF₆, PCl₃, PCl₅ ...) →
Fréquemment des liquides ou des gaz.

Halogénures ioniques:

-Propriétés acido-basiques

Les fluorures solubles, donnent des solutions faiblement basiques suite à la réaction d'hydrolyse de l'ion F⁻:

-Propriétés oxydoréductrices:

X⁻ à l'étage d'oxydation -1 sont des réducteurs.

Le pouvoir réducteur augmente avec la taille.

- Agents de précipitation:

F⁻, donne les sels insolubles CaF₂, SrF₂, MgF₂

Les ions Cl⁻, Br⁻, I⁻ donnent des sels insolubles avec les ions Ag⁺, Cu⁺, Hg²⁺ et Pb²⁺.

- Agents complexants:

F⁻ et Cl⁻, peuvent agir comme ligands:

Intérêt de la formation des ions complexes: permet la solubilisation de certains halogénures peu **solubles en présence d'un excès de l'anion:**

CARACTERISATION DES IONS HALOGENURES

LES FLUORURES:

LES CHLORURES:

LES BROMURES:

LES IODURES:

USAGES

Le fluor:

- L'acide fluorhydrique, sert à la gravure du verre
- Les hydrocarbures fluorés : les fréons (CCl_3F , CCl_2F_2 ...) sont des composés volatils utilisés comme liquides réfrigérants et dans les bombes aérosols.
- Le fluorure de calcium (CaF_2 utilisé dans la préparation des pâtes dentifrices).

Le chlore : est le plus important des halogènes, il est utilisé pour la chloration de nombreux produits organiques. Pur ou sous d'eau de Javel, il a des propriétés blanchissantes et désinfectantes.