Université Badji Mokhtar Annaba

Faculté de Médecine

Placenta

Cours d'Embryologie générale
1^{ère} Année Médecine Dentaire

Pr MALLEM Leila

Introduction

Développement embryonnaire

Embryon d'1 mois grossesse

Embryon d'2 mois grossesse

Évolution de la taille et de la masse de l'embryon puis du fœtus

Œuf humain est alécithe

Mise en place d'un système
embryo-trophique s'impose à 1
stade précoce du Dvpt Σaire
= placenta

Le placenta

constitué de tissus maternels et fœtaux, est une annexe embryonnaire où siègent des échanges sélectifs entre mère et fœtus, assurant:

- la respiration et
- la nutrition du fœtus,
- sa protection
- ainsi qu'une activité endocrine.

Fœtus et placenta

A terme, le placenta humain est un disque avec un diamètre de 20 cm environ, une épaisseur de 3 cm en moyenne et pesant 500 gr environ.

Le placenta est expulsé à la délivrance, environ 15 minutes après la naissance.

Le placenta

Face Foetale :
Plaque choriale

Face Maternelle :
Plaque basale

Le placenta pèse environ 500g, soit 1/6 du poids du Nné
Il mesure 20 cm de diamètre sur 3cm d'épaisseur

1. Caractéristiques du placenta humain

• **Hémochorial** : passage du sg. mat. ds. les l. Syncytiales (11^{ème} j.)

• **Discoïdal** : forme de disque, diamètre = 20 cm, épaisseur = 3 cm, $W_T = 500$ g.;

• **Pseudo-cotylédoné** : villosités placentaires se regroupent sous forme de cotylédons; et

• **Décidual** : Expulsion du placenta provoque la chute des caduques.

Rappel

Début de l'implantation

Développement des villosités placentaires

Au 6^{ème} Jour

- Une couche périphérique de cellules aplaties : **le trophoblaste**

Les cellules qui se divisent rapidement possèdent le même patrimoine génétique, et un groupe de cellules polyédriques ou sphériques, accolé au trophoblaste : le bouton embryonnaire

Les blastomères sont totipotents (très large pouvoir de différenciation).

Variation de la couche fonctionnelle l'Endomètre utérin au cours d'un cycle sans la fécondation et après fécondation

Mécanisme de la nidation

Au 7^{ème} jour : le blastocyste se fixe à l'épithélium utérin par l'intermédiaire du trophoblaste

- ❖ une couche interne cellulaire dite cytotrophoblaste.
 - ❖ une couche externe dite syncytiotrophoblaste, l'ensemble du cytotrophoblaste et du syncytiotrophoblaste
- Chorion**

Figure 3. Embryon humain de 8 jours

- **Au 9^{ème} jour** : des lacunes dites syncytiales apparaissent dans le syncytiotrophoblaste ; c'est le stade lacunaire.

Figure 4. Embryon humain de 10 jours

- ❖ Entre les 11^{ème} et 13^{ème} jours vaisseaux sanguins maternels s'ouvrent dans les lacunes syncytiales, le cytotrophoblaste forme des travées (évaginations).

Figure 5. Embryon humain de 13 jours

Prolifération du mésenchyme
entre les amnioblastes et le
cytotrophoblaste

Certaines cellules mésenchymateuses extra-embryonnaire se différencient en **îlots vasculo-sanguins primitifs** donnant naissance aux premiers capillaires sanguins et aux premières cellules sanguines.

Cet évènement se produit dans la lame chorale, dans la splanchnopleure et dans le mésenchyme constituant les villosités placentaires secondaires qui deviennent alors des **villosités placentaires tertiaires**.

Fin de la 3^{ème} semaine

Donc **Le développement villositaire** : Villosité trophoblastique
Il se met en place à partir de la sphère chorale. On distingue 3 stades d'évolution :

1. La villosité primaire

Elle se forme au 12ème jour. On a une prolifération de cellules cytotrophoblaste en regard du syncytiotrophoblaste. Il forme des amas de cellules cytotrophoblaste qui vont constituer l'axe central dans villosités primaire.

Dans cette axe on a un amas des cellules cytotrophoblastiques entourés par du syncytiotrophoblaste qui baigne dans le sang maternel.

Villosités placentaires

Au cours de la troisième semaine, les villosités se développent et leur axe est envahi par le mésenchyme extra-embryonnaire extra-cœlomique de la lame choriale. Elles deviennent ainsi des villosités secondaires que l'on retrouve tout autour de l'œuf.

Entre le 18ème et le 21ème jour, des îlots vasculo-sanguins se constituent dans l'axe mésenchymateux des villosités, comme dans tout le reste du mésenchyme extra-embryonnaire ; les villosités deviennent alors des villosités tertiaires.

Villosités placentaires

Jour 6-7
Apposition

Jour 7-8
Enfouissement

Jour 8-9
Stade lacunaire

Jour 12-15
Villosité primaire

Jour 15-21
Villosité secondaire

Jour 21- terme
Villosité tertiaire

Coupe au niveau du placenta humain

Coupe au niveau du placenta

Le sang veineux de la mère prend en charge les déchets de son bébé. Elle va éliminer le dioxyde de carbone par ses poumons et les autres déchets par ses urines.

Rôle du placenta

Titre : Les échanges entre le fœtus et la mère au niveau du placenta

Les échanges au niveau du placenta

	mère	enfant
nutriments	→	
déchets	←	
dioxygène	→	
dioxyde de carbone	←	
microbes	→	
nicotine	→	
alcool	→	
drogue	→