

Exercice1 : Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et g une fonction intégrable sur $[a, b]$ supposée positive.

1. Démontrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $\int_a^b f(x)g(x)dx = f(c)\int_a^b g(x)dx$.
2. Retrouver la formule de la moyenne.

Exercice2 : Calculer

1. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} x(1 + \tan^2 x)dx$.
2. $\int x \cdot \text{Arc sin } x \cdot dx$.

Exercice3 : Calculer

1. $\int \frac{dx}{\cos x}$.
2. $\int \frac{dx}{\sinh x}$.

Exercice4 : Soient f et g deux fonctions définies par

$$f(x) = \frac{2x+1}{x(x+1)(x+2)} ; \quad g(x) = \frac{x^5 - x^2 + x + 1}{(x^2 - x)(x^2 + x + 1)}$$

1. Décomposer $f(x)$ et $g(x)$ en éléments simples.
2. Calculer le plus simplement possible $\int f(x)dx$; $\int f(x^2)dx$; $\int g(x)dx$.

Exercice5 : Intégrer les équations différentielles suivantes

1. $y - 2xy' = 1$.
2. $y' \cos x + y \sin x = x$.
3. $y'' - 4y = x^2 + 1$.

Barème : Exo1 : 3 points.

Exo2 : 4 points.

Exo3 : 4 points.

Exo4 : 6 points.

Exo5 : 5 points.

Bonne chance... !

 **N.B:** Il sera tenu compte de la présentation de la copie.

Le corrigé de l'examen d'analyse II

Par

Dr. A. Moumeni

Exercice (1) :-

1- f continue sur $[a, b] \Rightarrow f$ bornée et atteint ses bornes m et M sur $[a, b]$, donc

$$m \leq f(x) \leq M \quad \forall x \in [a, b] \quad (0,5)$$

$$\Rightarrow m g(x) \leq f(x) g(x) \leq M g(x) \quad (\text{car } g \geq 0)$$

$$\Rightarrow m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x) g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx$$

$$\Rightarrow m \leq \frac{\int_a^b f(x) g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \leq M \quad (0,5)$$

Comme f est continue, alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires :

$$\exists c \in]a, b[\text{ tel que } f(c) = \frac{\int_a^b f(x) g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \quad (1)$$

d'où

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = f(c) \int_a^b g(x) dx$$

2- on pose $g(x) = 1$ dans la dernière formule

$$\exists c \in]a, b[\text{ tel que } f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx. \quad (1)$$

Exercice (2):- "Intégration par partie"

1- Posons $v(x) = x$ et $du(x) = (1 + \tan^2 x) dx$, alors

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{4}} x(1 + \tan^2 x) dx &= x \tan x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x dx \\ &= \frac{\pi}{4} + [\ln(\cos x)]_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{\pi}{4} + \ln \frac{\sqrt{2}}{2}.\end{aligned}$$

(2pt)

2. Posons $v(x) = \text{Arcsin } x$ et $du(x) = x dx$, alors

$$\begin{aligned}\int x \text{Arcsin } x dx &= \frac{1}{2} x^2 \text{Arcsin } x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= \frac{1}{2} x^2 \text{Arcsin } x - \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} + \int \sqrt{1-x^2} dx \\ &= \frac{1}{2} x^2 \text{Arcsin } x + \frac{1}{4} (\text{Arcsin } x + x\sqrt{1-x^2}) + C\end{aligned}$$

(2pt)

Exercice (3):-

1- Posons $\tan \frac{x}{2} = t \Rightarrow \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ et $dx = \frac{2 dt}{1+t^2}$, alors

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\cos x} &= \int \frac{1+t^2}{1-t^2} \cdot \frac{2 dt}{1+t^2} = 2 \int \frac{dt}{1-t^2} = \int \left(\frac{1}{1+t} + \frac{1}{1-t} \right) dt \\ &= \ln \frac{1+t}{1-t} + C = \ln \left| \frac{1+\tan \frac{x}{2}}{1-\tan \frac{x}{2}} \right| + C.\end{aligned}$$

(2pt)

2- Posons $\text{th} \frac{x}{2} = t \Rightarrow \sinh x = \frac{2t}{1-t^2}$ et $dx = \frac{2 dt}{1-t^2}$, alors

$$\int \frac{dx}{\sinh x} = \int \frac{1-t^2}{2t} \cdot \frac{2 dt}{1-t^2} = \int \frac{dt}{t} = \ln |t|$$

$$= \ln \left| \text{th} \frac{x}{2} \right| + C.$$

(2pt)