





Hyperplasie Bénigne de la prostate









Pr CHOUAKRIA Atef

Service d'urologie CHU Annaba Faculté de Médecine Annaba

Chouakria.halim@yahoo.fr






• SBAU : Symptômes du bas appareil urinaire

• TUBA: Troubles urinaires du bas appareil

 Dysurie : est la difficulté à l'évacuation de la vessie, doit être documentée par une débitmétrie urinaire (Qmax < 15 ml/s)



• Polyurie : production excessive d'urine, d'au moins 2,5 ou 3 litres par 24 h.

• Pollakiurie diurne : représentée par l'impossibilité de contenir les mictions plus de 2 heures durant le jour.

• Nycturie : besoin d'uriner réveillant le patient. Doit être différenciée de la "fréquence mictionnelle nocturne" qui correspond à la totalité des mictions nocturnes à partir du moment où le patient se couche mais sans tenir compte de la notion de réveil, dès qu'elle dépasse 3 mictions par nuit, constitue une gêne véritable au sommeil, tant du patient que de sa partenaire.

• Urgenturie : désir soudain, impérieux et fréquemment irrépressible d'uriner, pour des petites quantités d'urines.

• Incontinence urinaire : fuite involontaire d'urine par la voie naturelle.

• Hyperactivité vésicale : « Sd Clinique » urgenturie associé à une pollakiurie ou à une nycturie avec ou sans incontinence urinaire.

Objectifs


- Poser le diagnostic d'hyperplasie bénigne de prostate (HBP).
- Traiter et suivre un patient ayant des symptômes liés à une HBP.
- Identifier les situations pour lesquelles un avis spécialisé est requis : Quand passer la main ?
- Ne pas passer à cotés d'un cancer de la prostate.

Plan

- I. Introduction.
- II. Anatomie de la prostate.
- III. Ethiopathogénie et physiopathologie.
- IV. Bilan initial, et suivi de l'hyperplasie bénigne de prostate.
- V. Stratégie thérapeutique.


Introduction

- Touche surtout les hommes de plus de 50 ans.
- La maladie la plus fréquente de l'homme âgé.
- **Histologiquement**: l'HBP est définie par une hyperplasie stromale (fibro-musculaire) et épithéliale (glandulaire) de la zone de transition et péri-urétrale de la prostate.
- L'«HBP clinique» correspond à l'intrication de plusieurs composantes : « symptomatique »
 - une augmentation de volume de la prostate.
 - une obstruction sous-vésicale.
 - des SBAU.



Anatomie

- Petite glande génitale d'une quinzaine de grammes chez l'adulte jeune, mesure 3 cm en longueur et 4 cm en largeur pour une épaisseur de 2,5 cm.
- Son anatomie interne (zonale) modèle de McNeal +++




<u>Anatomie</u>

 Petite glande génitale d'une quinzaine de grammes chez l'adulte jeune, mesure 3 cm en longueur et 4 cm en largeur pour une épaisseur de 2,5 cm.

Aucun rôle urinaire.

Pathologie urinaire uniquement à cause de sa position anatomique ...

CARREFOUR



Le Dr G. Clemenceau.....

«...deux choses ne sont pas indispensables : la présidence de la république et la prostate... »

